



RN131

Ingrediënten: Zinkgluconaat, Microkristallijne cellulose, Dicalciumfosfaat, Rijstzetmeel, Glycerildibehenate, Siliciumdioxide.

Aanbevolen gebruik: Neem 1 - 2 tabletten per dag of zoals aanbevolen door de arts. De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid niet overschrijden.

Bewaarcondities - Advies voor gebruik: Buiten het bereik van jonge kinderen bewaren. Bewaren bij kamertemperatuur (15-25°C) in een gesloten verpakking. Raadpleeg uw arts indien u zwanger bent, borstvoeding geeft of een medische behandeling volgt, alvorens te gebruiken. Voedingssupplementen mogen niet als vervanging van een gevarieerde en evenwichtige voeding en van een gezonde levensstijl gebruikt worden.

Nutrined BV
Edisonstraat 4a _ 5051 DS Goirle _ +31 (13) 820 03 31
www.nutrined.nl _ order@nutrined.nl



Zink 40 mg

NN314

**60 tabletten -
comprimés - tablets
21.4 g e**

Voedingssupplement
Complément alimentaire
Food supplement

Samenstelling	Dagelijkse dosering*	% Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid RI
Zink (als Zinkgluconaat)	40 mg	400 %

* Dagdosering op basis van 1 tablet
Lotnr - Ten minste houdbaar tot einde: zie verpakking

Ingrédients : Gluconate de zinc, Cellulose microcristalline, Phosphate dicalcium, Amidon de riz, Dibéhénate de glycérol, Dioxyde de silicium.

L'apport Journalier recommandé : Prenez 1 - 2 comprimés par jour ou selon les recommandations du médecin. La quantité quotidienne ne doit pas être dépassée.

Conditions de stockage - Conseils d'utilisation : Tenir hors de portée des enfants. Conserver à température ambiante (15-25°C) dans un emballage fermé. Consultez un médecin si vous êtes enceinte, allaitez ou suivez un traitement médical. Ne remplace pas une alimentation variée et équilibrée ainsi qu'un style de vie sain.

Composition	Dose Quotidienne*	% Apport Journalier Recommandé PDR
Zinc (comme Gluconate de zinc)	40 mg	400 %

*** Dose quotidienne : 1 comprimé**
N° de lot - Date de péremption : voir emballage

Ingredients: Zinc gluconate, Microcrystalline cellulose, Dicalcium phosphate, Rice starch, Glycerildibehenate, Silicon dioxide.

Suggested use: Take 1 - 2 tablets per day or as directed by your health care professional. Do not exceed the suggested dose.

Storage conditions - Advise for use: Keep out of reach of children. Keep in a closed container below 25°C. Consult a physician if you are pregnant, breast feeding or following a medical treatment. Does not replace an adequate diet or healthy lifestyle.

Composition	Amount per serving*	% Daily Value RI
Zinc (as Zinc gluconate)	40 mg	400 %

* Daily dose based on 1 tablet
Expiry date - Lot N°: see package