



RN131

Ingrediënten: L-Lysine, Microkristallijne cellulose, Dicalciumfosfaat, Rijstzetmeel, Glyceridibehenaat, HPC, Siliciumdioxide.

Aanbevolen gebruik: Neem 2 - 3 tabletten 2 maal per dag verwijderd van de maaltijd of zoals aanbevolen door de arts. De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid niet overschrijden.

Bewaarcondities - Advies voor gebruik: Buiten het bereik van jonge kinderen bewaren. Bewaren bij kamertemperatuur (15-25°C) in een gesloten verpakking. Raadpleeg uw arts indien u zwanger bent, borstvoeding geeft of een medische behandeling volgt, alvorens te gebruiken. Voedingssupplementen mogen niet als vervanging van een gevarieerde en evenwichtige voeding en van een gezonde levensstijl gebruikt worden.

Nutrined BV
Edisonstraat 4a _ 5051 DS Goirle _ +31 (13) 820 03 31
www.nutrined.nl _ order@nutrined.nl


NUTRINED

L-Lysine
NNVS23

**60 tabletten -
comprimés - tablets
66,00 g e**

Voedingssupplement -
Complément alimentaire -
Food supplement

Samenstelling

L-Lysine

Dagdosering

2000 mg

**Aanbevolen
dagelijkse
hoeveelheid RI %**

-

* Dagdosering op basis van 4 tabletten
Lotnr + Ten minste houdbaar tot einde : zie verpakking

Ingrédients: L-Lysine, Cellulose microcristalline, Phosphate de dicalcium, Amidon de riz, Dibéhénate de glycérol, HPC, Dioxyde de silicium.

L'apport Journalier recommandé: Prenez 2 - 3 comprimés deux fois par jour loin du repas ou selon les recommandations du médecin. La quantité quotidienne ne doit pas être dépassée.

Conditions de stockage- Conseils d'utilisation: Tenir hors de portée des enfants. Conserver à température ambiante (15-25°C) dans un emballage fermé. Consultez un médecin si vous êtes enceinte, allaitez ou suivez un traitement médical. Ne remplace pas une alimentation variée et équilibrée ainsi qu'un style de vie sain.

Composition	Dose maximale quotidienne*	% Apport Journalier Recommandé PDR
L-Lysine	2000 mg	-

* Dose quotidienne : 4 comprimés
N° de lot - Date de péremption : voir emballage

Ingredients: L-Lysine, Microcrystalline cellulose, Dicalciumphosphate, Starch rice, Glycerildibehenate, HPC, Silicon dioxyde.

Suggested use: Take 2-3 tablets 2 times per day seperated from food or as directed by your health care professional. Do not exceed the suggested dose.

Storage conditions- Advise for use: Keep out of reach of children. Keep in a closed container below 25°C. Consult a physician if you are pregnant, breast feeding or following a medical treatment. Does not replace an adequate diet or healthy lifestyle.

Composition	Daily dose*	Daily value RI %
L-Lysine	2000 mg	-

* Daily dose based on 4 tablets
Expiry date - Lot N°: see package