



RN131

Ingrediënten: Microkristallijne cellulose, Vit B3 (Inositol hexanicotinaat), Rijstzetmeel, Glycerildibehenate, Vit B6 (Pyridoxal-5-fosfaat), Raapzaadolie, Silicium dioxide, Vit B12 (Methylcobalamine), Vit B9 (Calcium- L-Methyltetrahydrofolaat).

Aanbevolen gebruik: Eerste week: 1 tablet om de 3 dagen tijdens de maaltijd innemen; tweede week: 1 tablet om de 2 dagen tijdens de maaltijd innemen, vanaf week 3: 1 tablet per dag tijdens de maaltijd innemen. De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid niet overschrijden.

Bewaarcondities - Advies voor gebruik: Buiten het bereik van jonge kinderen bewaren. Bewaren bij kamertemperatuur (15-25°C) in een gesloten verpakking. Raadpleeg uw arts indien u zwanger bent, borstvoeding geeft of een medische behandeling volgt, alvorens te gebruiken. Voedingssupplementen mogen niet als vervanging van een gevarieerde en evenwichtige voeding en van een gezonde levensstijl gebruikt worden.

Nutrined BV

Edisonstraat 4a _ 5051 DS Goirle _ +31 (13) 820 03 31
www.nutrined.nl _ order@nutrined.nl

**NUTRINED**

Methylation
NN325

**100 tabletten -
comprimés - tablets
40 g e**

Voedingssupplement
Complément alimentaire
Food supplement

Samenstelling	Dagelijkse dosering*	% Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid RI
Vitamine B3 (als Niacine flush free)	50 mg	313 %
Vitamine B6 (als Pyridoxine)	6.4 mg	457 %
Vitamine B12 (als Methylcobalamine)	2 mg	80.000 %
Vitamine B9 (als Calcium-L-Methyl-tetrahydrofolaat)	0.5 mg	202 %

* Dagdosering op basis van 1 tablet

Lotnr - Ten minste houdbaar tot einde: zie verpakking

Ingrédients : Cellulose microcristalline, Vit B3 (Inositol hexanicotinate), Amidon de riz, Dibéhénate de glycérol, Vit B6 (Pyridoxal-5-phosphate), Huile de colza, Dioxyde de silicium, Vit B12 (Méthylcobalamine), Vit B9 (Calcium- L-Méthyltétrahydrofolate).

L'apport Journalier recommandé : Première semaine : prenez 1 comprimé tous les 3 jours pendant le repas ; deuxième semaine : prenez 1 comprimé tous les 2 jours pendant le repas, à partir de la troisième semaine : prenez 1 comprimé par jour pendant le repas. La quantité quotidienne ne doit pas être dépassée.

Conditions de stockage - Conseils d'utilisation : Tenir hors de portée des enfants. Conserver à température ambiante (15-25°C) dans un emballage fermé. Consultez un médecin si vous êtes enceinte, allaitez ou suivez un traitement médical. Ne remplace pas une alimentation variée et équilibrée ainsi qu'un style de vie sain.

Composition	Dose Quotidienne*	% Apport Journalier Recommandé PDR
Vitamine B3 (comme Niacin flush free)	50 mg	313 %
Vitamine B6 (comme Pyridoxine)	6.4 mg	457 %
Vitamine B12 (comme Méthylcobalamine)	2 mg	80.000 %
Vitamine B9 (comme Calcium-L-Méthyl-tetrahydrofolate)	0.5 mg	202 %

*** Dose quotidienne : 1 comprimé**
N° de lot - Date de péremption : voir emballage

Ingredients: Micro crystalline cellulose, Vit B3 (Inositol hexanicotinate), Starch rice, Glycerildibehenate, Vit B6 (Pyridoxal-5-phosphate), Rape seed oil, Silicon dioxyde, Vit B12 (Methylcobalamin), Vit B9 (Calcium- L-Methyltetrahydrofolate).

Suggested use: First week: take 1 tablet every 3 days during the meal; second week: take 1 tablet every 2 days during the meal, from week 3; take 1 tablet a day during the meal. Do not exceed the suggested dose.

Storage conditions - Advise for use: Keep out of reach of children. Keep in a closed container below 25°C. Consult a physician if you are pregnant, breast feeding or following a medical treatment. Does not replace an adequate diet or healthy lifestyle.

Composition	Amount per serving*	% Daily Value RI
Vitamin B3 (as Niacin flush free)	50 mg	1313 %
Vitamin B6 (as Pyridoxine)	6.4 mg	457 %
Vitamin B12 (as Methylcobalamin)	2 mg	80.000 %
Vitamin B9 (as Calcium-L-Methyl-tetrahydrofolate)	0.5 mg	202 %

* Daily dose based on 1 tablet
Expiry date - Lot N°: see package